

Dazu gehören chronische Erkrankungen wie

- Anfallsleiden im Akutstadium (Epilepsie)
- Schwere Herz- und Kreislaufstörungen
  - Bluthochdruck mit mehrfacher Tablettenkombination
  - Z.B. Herzinsuffizienz ab NYHA II
  - Herzinfarkt in vergangenen 12 Monaten
  - Chronisches Coronarsyndrom (Verengungen der Herzkranzgefäße
  - Herzklappeneinengungen ( Stenosen) und Herzklappenersatz in Kombination mit weiteren Risikofaktoren)
  - Kardiomyopathie
  - Schwere Herzrhythmusstörung
  - Herzschrittmacher in Kombination mit anderen Herz-Kreislaufstörungen
- Zuckerkrankheit (Diabet.mel.) mit Spätkomplikationen und/oder HbA1c > 8%
- Psychosen, schwere Depressionen
- Suchterkrankungen im Akutstadium
- Chronische Einschränkungen der Nierenfunktion und der Leberfunktion, Dialysepatienten
- Akute entzündliche Erkrankungen des Bewegungsapparates (Rheumaschub, Arthrose)
- Akuter Bandscheibenvorfall
- Tumorerkrankungen in fortgeschrittenem Stadium
- Generell Adipositas ab BMI 40 ( hier Einzelfallentscheidungen in Kombination mit weiteren Risikofaktoren und körperlicher Belastbarkeit)
- Alter der Patientinnen und Patienten über 50 Jahre nicht als ausschließliches Kriterium sondern in Kombination mit zusätzlichen Erkrankungen.

Carolinensiel, 30.09.2020